

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

MAGNETIL- C COMPRIMIDOS EFERVECENTES

COMPOSICIÓN

Cada comprimido efervescente contiene:

Ácido ascórbico	500,00 mg
Oxido de Magnesio (equiv. a 100 mg de magnesio)	165,90 mg
Sulfato de magnesio (equiv. a 34,86 mg de magnesio)	353,76 mg

Excipientes c.s: Acido adípico, Colorante FD&C Amarillo N°6, Ácido cítrico, Bicarbonato de sodio, Sorbitol, Sabor limón, Sabor naranja, Aspartame, Sacarina de sodio.

ACCIÓN TERAPÉUTICA E INDICACIONES

Prevención y tratamiento de la hipomagnesemia asociada con hipovitaminosis C.

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia renal grave.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Ocasionalmente trastornos gástricos leves y diarreas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No administrar conjuntamente con sales de calcio ni simultáneamente con tetraciclinas pues se reduce la absorción.

Precauciones:

No tomar más de 3 comprimidos al día, ni tomar la dosis máxima por un período de más de 2 semanas, salvo por indicación médica expresa.

- Puede tener efecto laxante
- Debe controlarse la magnesemia, a fin de suspender el tratamiento oportunamente.
- Si está embarazada o amamantando debe consultar al médico antes de tomar este medicamento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Evitar la administración conjunta con tetraciclinas porque disminuye la absorción del antibiótico.

La administración conjunta con sales cálcicas o productos a base de fosfatos inhiben la absorción intestinal del magnesio.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Disolver el comprimido efervescente en medio vaso de agua o bebida refrescante.

Como dosis media se aconseja un comprimido dos veces al día.

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 30 comprimidos efervescentes.

CONSERVACIÓN:

Conservar en un lugar fresco y seco a no más de 30°C.