

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

### **LERTUS GEL TÓPICO 1% DICLOFENACO DIETILAMINA**

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de tomar el medicamento.**

- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe dársele a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

**Contenido del prospecto:**

- 1- ¿Qué es LERTUS y para qué se utiliza?
- 2- Antes de usar LERTUS.
- 3- ¿Cómo usar LERTUS?
- 4- Posibles eventos adversos.
- 5- Conservación del envase.
- 6- Información adicional.

#### **1- ¿QUÉ ES LERTUS Y PARA QUÉ SE UTILIZA?**

Diclofenaco dietilamina, el principio activo de este medicamento pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos y actúa como analgésico y antiinflamatorio local.

LERTUS está indicado en adultos y adolescentes mayores de 14 años para el alivio local del dolor y de las inflamaciones leves y ocasionales producidos por:

- Pequeñas contusiones, golpes, distensiones
- Tortícolis u otras contracturas
- Lumbalgias
- Esguinces leves producidos como consecuencia de una torcedura

## 2- ANTES DE USAR LERTUS

### **No tome LERTUS:**

- Si es alérgico al diclofenaco o a cualquier otro medicamento antiinflamatorio no esteroideo utilizado en el tratamiento del dolor, la fiebre o la inflamación como el ibuprofeno o ácido acetilsalicílico, o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. Si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico. Los síntomas relacionados con una reacción alérgica a estos medicamentos pueden ser: asma, dificultad para respirar, erupción cutánea o picazón, hinchazón en la cara o en la lengua y goteo nasal.
- Si está en los 3 últimos meses del embarazo.
- Si es menor de 14 años.
- No aplicar sobre heridas, lesiones eczematosas, mucosas, ni en quemaduras.

### **Tenga especial cuidado:**

No aplique en lugares de la piel donde existan cortes o heridas abiertas, ni en las mucosas, ni sobre eczemas o lugares donde haya una erupción de la piel. Deje de utilizar el medicamento si se produce una erupción en la piel tras la aplicación.

No utilice en zonas extensas, utilice exclusivamente en la zona afectada.

Evite el contacto de LERTUS con los ojos. Si esto ocurriera, enjuague los ojos con abundante agua limpia. Consulte a su médico en caso de que sienta alguna molestia posterior.

No utilice vendajes oclusivos.

No utilice más cantidad del medicamento de la indicada, ni durante un periodo de tiempo superior al indicado, salvo por consejo de su médico.

No aplique simultáneamente LERTUS en la misma zona en la que se hayan aplicado otros medicamentos.

No ingiera este medicamento ni lo utilice en la boca. LERTUS es para uso externo únicamente. Consulte a su médico o farmacéutico en caso de ingestión

accidental.

Las zonas tratadas no deben exponerse al sol (aun estando nublado) ni a lámparas de radiaciones ultravioleta (rayos UVA).

No utilice durante el primer y segundo trimestre de embarazo salvo criterio médico.

***Tenga en cuenta que:***

Debe informar a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, especialmente analgésicos, incluso los adquiridos sin receta.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Durante los seis primeros meses de embarazo sólo debe utilizarse LERTUS después de consultarlo con su médico. Durante los tres últimos meses de embarazo, no debe utilizarse este medicamento, ya que puede dañar al futuro bebé, o causar problemas en el parto.

En periodo de lactancia no use LERTUS, excepto que se lo haya indicado su médico, ya que el diclofenaco pasa a la leche materna en pequeñas cantidades. No debe aplicarse en ningún caso en madres en periodo de lactancia directamente sobre la zona del pecho, ni en otras zonas en áreas extensas de la piel durante periodos prolongados de tiempo.

Este medicamento no está recomendado para uso en niños y adolescentes menores de 14 años, debido a que no hay suficientes datos disponibles sobre seguridad y eficacia.

No se ha descrito ningún efecto sobre la capacidad para conducir vehículos y de usar maquinaria cuando se usa externamente sobre la piel.

LERTUS puede producir irritación de la piel porque contiene propilenglicol.

### 3- ¿CÓMO USAR LERTUS?

Siga exactamente las siguientes instrucciones de administración de LERTUS, a no ser que su médico le haya indicado otras distintas. Consulte con su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Este medicamento es para aplicarlo únicamente sobre la piel (uso cutáneo).

Aplicar 3 o 4 veces al día una pequeña cantidad de gel sobre la zona inflamada o dolorida.

La cantidad de gel variará dependiendo del tamaño de la zona afectada (normalmente, será suficiente aplicar una cantidad similar al tamaño de entre una cereza y una nuez). Extienda una fina capa del gel sobre la zona de la piel donde exista el dolor y la inflamación, mediante un suave masaje.

Utilice la menor cantidad necesaria durante el menor tiempo que sea requerido.

Cierre bien el tubo después de su utilización.

Lávese las manos después de la aplicación del gel, a no ser que estas sean el área a tratar.

Si el dolor o la hinchazón empeoran o persisten después de 7 días de tratamiento, consulte con su médico.

***Si olvidó usar LERTUS:***

Si olvidó aplicar este medicamento cuando correspondía, aplique el gel tan pronto como sea posible y continúe de manera normal el tratamiento.

No aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

***Si uso más LERTUS del que debe o ingirió LERTUS accidentalmente:***

Si ingiere accidentalmente LERTUS o si lo ha utilizado sobre una gran zona de la piel y durante un largo período de tiempo, pueden ocurrir reacciones adversas similares a las producidas por el diclofenaco cuando se toma por vía oral (por ej. comprimidos).

Si ha aplicado demasiada cantidad del medicamento, se recomienda eliminarla lavando la zona afectada con abundante agua, o bien, retirando una parte.

#### **ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO**

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

#### **4- POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Al igual que todos los medicamentos, LERTUS puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

##### ***Algunos efectos adversos pueden ser graves:***

Si usted experimenta alguno de los siguientes signos de alergia, deje de usar LERTUS y consulte con un médico inmediatamente:

- Raros: Erupción de la piel acompañada, o no, de ampollas; urticaria (ronchas rojizas, elevadas y a menudo con sensación de picazón y quemazón)
- Muy raros: Dificultad para respirar o sensación de presión en el pecho (asma); hinchazón en la cara, labios, lengua o garganta.

##### ***Efectos adversos no graves:***

Pueden producirse otros efectos adversos, pero éstos suelen ser leves y de duración transitoria. Si nota alguno de ellos, consulte con su médico o farmacéutico lo antes posible.

- Frecuentes: Erupción, picazón, enrojecimiento o escozor en la piel después de usar el producto.
- Muy raros: La piel pudiera ser más sensible a la luz del sol (fotosensibilidad). Los signos son: quemadura solar con picazón, hinchazón y ampollas.

**Si considera que alguno de los eventos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en esta información informe a su médico o farmacéutico.**

## 5- CONSERVACIÓN DEL ENVASE:

Almacenar a temperatura no mayor de 30° C.

## 6- INFORMACIÓN ADICIONAL:

### **Presentaciones:**

Envases conteniendo un pomo por 60gr

### **Fórmula:**

#### **Cada 100 gramos de gel contienen:**

Diclofenaco dietilamina	1,160 g
(Equivalente a Diclofenaco sódico	1,000 g)

Excipientes c.s: Alcohol isopropílico, Metilparabeno, Carbopol 940, Macrogol 400, Propilenglicol, Cera emulsionable, Vaselina líquida, Trietanolamina, Miristato de isopropilo, Esencia de lavanda, Agua purificada.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACIÓN MÉDICA.**

**NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

**Mayor información en [www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)**