

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

REGENTAL FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 60 mg

Nimodipino

Condición de venta : Bajo receta médica
Clasificación : Terapéutico cerebrovascular. Antagonista del calcio

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICION:

- Principio Activo : Nimodipino 60,00 mg
- Excipientes : Almidón de maíz, Mezcla de lactosa monohidrato y celulosa microcristalina (Cellactosa), Lactosa, Lauril sulfato de sodio, Dióxido de silicio coloidal, Estearato de magnesio, Croscarmelosa sódica, Hipromelosa, Dióxido de titanio, Macrogol, Polisorbato 80.

PRESENTACION: envase con 40 comprimidos recubiertos.

INDICACIONES:

Al conocer el mecanismo de acción de REGENTAL se desprenden las indicaciones del mismo: 1) Síndrome arterioesclerótico, alteraciones del oído medio, trastornos de la memoria, desorientación, confusión alteración en la concentración y el lenguaje. 2) Insuficiencia cerebrovascular severa, síndromes demenciales. 3) Enfermedad de Alzheimer. 4) En la profilaxis y terapéutica del déficit neurológico isquémico debido a vasoespasmio cerebral tras hemorragias subaracnoideas. Como se puede desprender de las indicaciones, en todas ellas el elemento de base es una disminución en la oferta de oxígeno y el consecuente daño metabólico.

CLASIFICACION:

Terapéutico cerebrovascular. Antagonista del calcio.

ADVERTENCIAS:

El principio activo es sensible a la luz, por lo tanto debe evitarse el uso con luz de sol directa. Se recomienda, dado el caso de infusión por bomba u otros medios, proteger con envoltura que no permita el traspaso de la luz, utilizar jeringas de color negro o marrón. Con el empleo en luz natural o artificial difusa, la solución es utilizable dentro de las 10 horas.

No administrar a niños menores de 12 años sin indicación médica.

CONTRAINDICACIONES:

Debe usarse con precaución si hay elevación del contenido hídrico del tejido cerebral (edema generalizado) o presión arterial muy elevada, ya que eleva el contenido hídrico del tejido cerebral.

INTERACCIONES:

En pacientes con presión arterial alta, que reciben drogas que disminuyen la presión, la solución de infusión de Nimodipina puede intensificar la acción de la droga concomitante.

Las combinaciones con otros antagonistas de calcio (ej. Nifedipina, Diltiazem, Verapamil) ó Beta-simpatolítico, deben en lo posible, evitarse. Sin embargo, si tal combinación resultara imprescindible, será precisa una vigilancia especialmente cuidadosa del paciente.

El tratamiento debe prolongarse por 7 días.

EFECTOS SECUNDARIOS:

A las dosis recomendadas, en general es bien tolerado, al comienzo del tratamiento pueden presentarse cefaleas, rubefacción facial (Flush), molestias gastrointestinales, náuseas, mareos, astenia, sensación de calor, hipotensión y dolor precordial. En este caso deberá ser informado el médico.

También se ha informado taquicardia, extrasístole, alteraciones de enzimas, hepatocelulares, calambres abdominales, constipación, agitación y sequedad de la boca.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION:

La dosis recomendada para los casos de profilaxis y la terapia del déficit neurológico isquémico debido a vasoespasma cerebral tras hemorragia subaracnoidea, será de 60 mg por vía oral cada 4 horas, durante 21 días. Para los casos de déficit del área cognitiva no asociado a un cuadro vascular agudo, la dosis será de 60mg cada 12 horas. En los casos de un déficit severo del área cognitiva o afectiva producto de un deterioro orgánico, la dosis recomendada es de 60mg cada 8 horas.

No repita el tratamiento sin indicación médica

No recomiende este medicamento a otra persona