

## FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

### **MAGNATIL-C CÁLCICO COMPRIMIDOS EFERVESCENTES**

#### **MAGNATIL-C CÁLCICO COMPRIMIDOS EFERVESCENTES**

Vitamina C con Magnesio y Calcio

30 comprimidos efervescentes

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

#### **COMPOSICIÓN:**

##### ***Cada comprimido efervescente contiene:***

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Ácido Ascórbico                 | 100,0 mg |
| Magnesio (como óxido y sulfato) | 103,2 mg |
| Calcio                          | 250,0 mg |

Excipientes c.s: Ácido cítrico, Bicarbonato de Sodio, Ácido adípico, Sacarina Sódica, Aspartamo (20mg), Saborizante limón, Saborizante naranja, Colorante amarillo FD& C N° 6 (Amarillo crepúsculo), Sorbitol.

**Este producto contiene Aspartamo no administrar a personas que padecen fenilcetonuria**

##### ***Vía de Administración:***

Oral

#### **PRESENTACIÓN:**

Envases con 30 comprimidos efervescentes.

**INDICACIONES:**

Prevención y tratamiento de la hipomagnesemia asociada con hipovitaminosis C.

Aporte de Calcio.

Suplemento en estados carenciales de Magnesio y Vitamina C, con aporte de Calcio.

**CLASIFICACIÓN:**

Vitaminoterapia C con calcio

**ADVERTENCIAS:**

No administrar a niños menores de 12 años sin indicación médica.

**CONTRAINDICACIONES:**

Insuficiencia renal grave. Insuficiencia hepática grave. Hipercalcemia. Antecedentes cálculos renales a repetición. Úlcera gástrica e insuficiencia cardíaca. Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

**INTERACCIONES:**

Evitar la administración conjunta con tetraciclinas, porque disminuye la absorción del antibiótico.

La administración conjunta con sales cálcicas o productos a base de fosfatos inhibe la absorción intestinal del magnesio.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Ocasionalmente trastornos gástricos leves, diarreas y rash.

**PRECAUCIONES:**

No tomar más de tres comprimidos al día ni tomar la dosis máxima por un período de más de 2 semanas, salvo por indicación médica expresa.

Puede tener efecto laxante.

Debe controlarse la magnesemia, a fin de suspender el tratamiento oportunamente.

Si el paciente es una embarazada o una madre que amamanta, debe consultar al médico antes de tomar este medicamento.

### **POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:**

El médico deberá indicar la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

Un comprimido dos veces al día.

Disolver el comprimido efervescente en medio vaso de agua o bebida refrescante.

Conservar en lugar fresco y seco a no más de 30° C.

**No repita el tratamiento sin indicación médica**

**No recomiende este medicamento a otra persona**