FOLLETO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

REPATHA SOLUCIÓN INYECTABLE 140 mg/1 mL
EVOLOCUMAB

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.
- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otros, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

Contenido del prospecto

1. Qué es Repatha y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Repatha
3. Cómo usar Repatha
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Repatha
6. Contenido del envase e información adicional

1. ¿QUÉ ES REPATHA Y PARA QUE SE UTILIZA?

Qué es Repatha y cómo funciona

Repatha es un medicamento que reduce los niveles de colesterol “malo”, un tipo de grasa que se encuentra en la sangre.

Repatha contiene el principio activo evolocumab, un anticuerpo monoclonal (un tipo de proteína especializada, diseñada para unirse a una sustancia concreta en el cuerpo). Evolocumab se desarrolló para unirse a una sustancia llamada PCSK9 que influye en la capacidad del hígado para captar colesterol. Cuando se une a la PCSK9 y la elimina, el medicamento aumenta la cantidad

de colesterol que entra en el hígado y, de este modo, reduce el nivel de colesterol en la sangre.

Para qué se utiliza Repatha

Repatha se utiliza como complemento de la dieta para reducir el colesterol en los siguientes pacientes:

- Adultos con un nivel alto de colesterol en la sangre [hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigótica y no familiar) o dislipidemia mixta]. Se administra de la siguiente manera:
  - en combinación con una estatina o con otros tratamientos para reducir el colesterol cuando la dosis máxima de estatina no reduce los niveles de colesterol de forma suficiente
  - solo o en combinación con otros tratamientos para reducir el colesterol en pacientes en los que las estatinas no tienen buenos resultados o están contraindicadas

- Pacientes a partir de 12 años con altos niveles de colesterol en la sangre debido a una afección hereditaria (hipercolesterolemia familiar homocigótica o HFH).
  - en combinación con otros tratamientos para reducir el colesterol

- Adultos con un alto nivel de colesterol en la sangre y con una enfermedad cardiovascular ateroesclerótica establecida (antecedentes de ataque cardiaco, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial). Se administra de la siguiente manera:
  - en combinación con estatina o medicación para reducir el colesterol, si la dosis máxima tolerada de estatina no reduce los niveles de colesterol de forma suficiente
  - solo o en combinación con otra medicación para reducir el colesterol en pacientes en los que las estatinas no tienen buenos resultados o están contraindicadas

Repatha se utiliza en pacientes que no pueden controlar sus niveles de colesterol solo mediante una dieta para reducir el colesterol. Usted debe continuar con su dieta para reducir el colesterol mientras toma este medicamento. Repatha puede ayudar a prevenir ataques cardíacos y

accidentes cerebrovasculares, así como también en determinados procedimientos cardíacos para restaurar el flujo sanguíneo debido a una acumulación de depósitos grasos en las arterias (lo que también se conoce como enfermedad cardiovascular ateroesclerótica).

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR REPATHA

No use Repatha si es alérgico a evolocumab o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones
Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de empezar a usar Repatha si usted tiene una enfermedad del hígado.

El capuchón de la aguja de la jeringa de vidrio prellenada o del autoinyector prellenado están fabricados con caucho natural (un derivado del látex), que puede causar reacciones alérgicas graves.

A fin de mejorar la trazabilidad de este medicamento, su médico o farmacéutico deben anotar en su registro del paciente el nombre y el número de lote del producto que se le entregó. También se recomienda que usted registre estos detalles en caso de que se le consulte por esta información en el futuro.

Niños y adolescentes
No se ha estudiado el uso de Repatha en niños menores de 18 años que reciben tratamiento para la hipercolesterolemia primaria y la dislipidemia mixta.

No se ha estudiado el uso de Repatha en niños menores de 12 años que reciben tratamiento para la hipercolesterolemia familiar homocigótica.

Otros medicamentos y Repatha
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en período de lactancia, si piensa que está embarazada o si planea quedar embarazada, pida asesoramiento a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Repatha no se ha estudiado en mujeres embarazadas. Se desconoce si Repatha puede dañar al feto.

Se desconoce si Repatha está presente en la leche materna.

Es importante que informe a su médico si está dando el pecho a su hijo o tiene intención de dar el pecho. Su médico le ayudará a decidir si debe interrumpir la lactancia materna o el tratamiento con Repatha, teniendo en cuenta los beneficios de la lactancia materna para el bebé y los beneficios de Repatha para la madre.

Conducción y uso de máquinas
La influencia de Repatha sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

Repatha contiene sodio
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis; esto es, esencialmente "exento de sodio".

3. ¿CÓMO USAR REPATHA?

Use este medicamento exactamente como se lo indicó su médico. En caso de duda, consulte a su médico.

La dosis recomendada depende de la enfermedad de base:

- en pacientes adultos con hipercolesterolemia primaria y dislipidemia mixta, la dosis es de 140 mg cada dos semanas o 420 mg una vez al mes.
- en pacientes adultos y adolescentes con hipercolesterolemia familiar homocigótica, la dosis inicial recomendada es de 420 mg una vez al mes. Después de 12 semanas de tratamiento, el médico puede decidir aumentar la dosis a 420 mg cada dos semanas. Si el paciente recibe

aféresis, un proceso similar al de diálisis por el cual el colesterol y otras grases se separan de la sangre, el médico pude decidir iniciar el tratamiento con 420 mg cada dos semanas para que coincida con su tratamiento de aféresis.
- en adultos con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica establecida (antecedentes de ataque cardiaco, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial), la dosis recomendada de Repatha es de 140 mg cada dos semanas o 420 mg una vez al mes.

Repatha se administra mediante una inyección debajo de la piel (vía subcutánea).

Si su médico le receta una dosis de 420 mg debe utilizar tres jeringas prellenadas o tres autoinyectores prellenados, ya que cada jeringa o autoinyector prellenado solo contiene 140 mg de medicamento. Después de alcanzar la temperatura ambiente, todas las inyecciones se deben administrar dentro de los 30 minutos.

Si su médico considera que usted o un cuidador pueden administrar las inyecciones de Repatha, usted o su cuidador deben recibir capacitación sobre la manera correcta de preparar e inyectar Repatha. No intente inyectar Repatha hasta que su médico o enfermero le hayan mostrado cómo hacerlo.
Consulte las “Instrucciones de uso” detalladas que aparecen al final de este prospecto para informarse sobre cómo conservar, preparar y administrar las inyecciones de Repatha en casa. Si usa el autoinyector prellenado, **coloque el extremo correcto (amarillo)** del autoinyector **sobre la piel antes de la inyección.**

Antes de empezar el tratamiento con Repatha, debe estar siguiendo una dieta para reducir el colesterol. Mientras utiliza Repatha, debe continuar con esta dieta para reducir el colesterol.

Si su médico le ha recetado Repatha junto con otro medicamento para reducir el colesterol, siga sus instrucciones acerca de cómo utilizar estos medicamentos conjuntamente. En este caso, lea también las instrucciones de administración del prospecto de ese medicamento concreto.

Si usa más Repatha del que debe
Póngase en contacto de inmediato con su médico o farmacéutico.

Si olvidó tomar Repatha
Administre la dosis olvidada tan pronto como pueda. A continuación, póngase en contacto con su médico para que le indique cuándo administrar la dosis siguiente, y siga la nueva pauta exactamente como le haya indicado su médico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)
- Gripe (fiebre, dolor de garganta, secreción nasal, tos y escalofríos)
- Resfriado común, como secreción nasal, dolor de garganta o infección sinusal (nasofaringitis o infecciones del tracto respiratorio superior)
- Malestar (náuseas)
- Dolor de espalda
- Dolor articular (artralgia)
- Dolor muscular
- Reacciones en el lugar de la inyección, como por ejemplo hematoma, enrojecimiento, sangrado, dolor o hinchazón
- Reacciones alérgicas incluido un sarpullido
- Cefalea

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)
- Ronchas rojas en la piel con picor (urticaria)
- Síntomas de tipo gripal

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)
- Hinchazón de cara, boca, lengua o garganta (angioedema)

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente

(consulte los detalles más abajo). La comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Para mayor información acerca de REPATHA, llamar a Tecnofarma S.A. al 2-5949201

5. CONSERVACIÓN DE REPATHA

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta y el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Conservar refrigerado entre 2 °C a 8 °C. No congelar.
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.

La jeringa prellenada o el autoinyector prellenado se pueden dejar fuera del refrigerador para que alcance la temperatura ambiente (hasta 25 °C) antes de la inyección. De este modo, la inyección será menos molesta. Una vez fuera del refrigerador, Repatha se puede conservar a temperatura ambiente (hasta 25 °C) en el envase original y debe utilizarse dentro de los 30 días.

No utilice este medicamento si nota alteraciones en su color o si este contiene bultos grandes, escamas o partículas de color.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.

Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de Repatha

- El principio activo es evolocumab. Cada jeringa prellenada o autoinyector prellenado SureClick contiene 140 mg de evolocumab en 1 mL de solución.
- Los demás componentes son prolina, ácido acético glacial, polisorbato 80, hidróxido de sodio, agua para inyección.

Aspecto de Repatha y contenido del envase

Repatha es una solución transparente a opalescente, incolora a amarillo pálido, y prácticamente libre de partículas.

Jeringa prellenada: Envase que contiene una jeringa prellenada de un solo uso.

Autoinyector prellenado: Envase que contiene uno, dos, tres o seis envases de autoinyectores prellenados SureClick de un solo uso.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

Titular de la autorización de comercialización

Tecnofarma S.A.
Pedro de Valdivia 1215,
Piso 6, Providencia,
Santiago, Chile

Fabricante

Amgen Manufacturing Limited,
State Road 31, KM 24.6
Juncos, Puerto Rico 00777 (U.S.A.)

Para solicitar más información respecto a este medicamento, comuníquese con el representante local del titular de la autorización de comercialización:

Tecnofarma S.A. al 2-5949201.

No repita el tratamiento sin prescripción médica.
No recomiende este producto a otra persona.

APROBADO EN CHILE BAJO EL SIGUIENTE NÚMERO DE REGISTRO

Reg. ISP Nº B-2773

Instrucciones de uso: **Repatha jeringa prellenada de uso único**

Guía de los componentes	
Antes del uso	**Después del uso**
	
	La aguja está en el interior.

Importante
Antes de utilizar una jeringa prellenada de uso único de Repatha, lea esta información importante:
• **No** congele la jeringa prellenada de Repatha ni utilice una jeringa que se haya congelado. • **No** utilice la jeringa prellenada de Repatha si el envase está abierto o dañado. • **No** utilice la jeringa prellenada de Repatha si ha caído sobre una superficie dura. Es posible que algún componente de la jeringa esté roto, aunque no pueda ver la rotura. Utilice una jeringa prellenada de Repatha nueva. • **No** retire el capuchón gris de la aguja de la jeringa prellenada de Repatha antes de estar listo para la inyección.

Paso 1: Preparación	
A	**Saque el envase con la jeringa prellenada de Repatha del refrigerador y espere 30 minutos.**
Espere por lo menos 30 minutos a que la jeringa prellenada alcance naturalmente la temperatura ambiente en el envase antes de aplicar la inyección.	
Compruebe que en el texto impreso del envase aparezca el nombre Repatha. • **No** intente calentar la jeringa prellenada de Repatha con una fuente de calor como agua caliente o un microondas. • **No** exponga la jeringa prellenada de Repatha a la luz directa del sol. • **No** agite la jeringa prellenada de Repatha.	

B	**Reúna todos los materiales que necesita para la inyección.**

Lávese bien las manos con agua y jabón.

Sobre una superficie de trabajo limpia, bien iluminada y plana, coloque lo siguiente:

- Una jeringa prellenada de Repatha en su bandeja.
- Paños con alcohol.
- Un algodón o una gasa.
- Venda adhesiva.
- Un contenedor para desechar objetos punzantes.
- **NO** utilice la jeringa prellenada de Repatha si ya ha pasado la fecha de caducidad que aparece en el envase.

C	**Elija un lugar para la inyección.**



Puede utilizar los siguientes lugares:

- Muslo.
- Abdomen, excepto los 5 centímetros alrededor del ombligo.
- Parte externa del antebrazo (únicamente si es otra persona la que le administra la inyección).
- **No** seleccione un lugar de la piel que presente dolor a la palpación o moretones, o esté enrojecida o dura. Evite los lugares con cicatrices o estrías.

Seleccione un lugar diferente para cada inyección. Si necesita utilizar el mismo lugar para la inyección, asegúrese de no aplicar la inyección en el mismo punto que la última vez.

D	**Limpie el lugar de la inyección.**

Limpie el lugar de la inyección con un paño con alcohol. Deje que la piel se seque antes de aplicar la inyección.

- **No** toque este lugar de la piel antes de la inyección.

E	**Retire la jeringa prellenada de la bandeja.**

Dé la vuelta a la bandeja

Presione suavemente



Para quitar la jeringa, haga lo siguiente:

- Retire el papel de la bandeja.
- Coloque la bandeja en la mano.
- Dé la vuelta a la bandeja y presione suavemente en la mitad de la parte de atrás para que la jeringa le caiga en la mano.
- Si la jeringa prellenada no se suelta de la bandeja, presione suavemente la parte de atrás de la bandeja.
- **No** tome la jeringa prellenada o tire de esta por el émbolo o por el capuchón gris de la aguja. Esto podría dañar la jeringa.
- **No** retire el capuchón gris de la aguja de la jeringa prellenada antes de estar listo para la inyección.

Sujete siempre la jeringa prellenada por el cuerpo de la jeringa.

F	**Inspeccione el medicamento y la jeringa.**



Sostenga siempre la jeringa prellenada por el cuerpo de la jeringa.
Compruebe lo siguiente:

- El nombre Repatha aparece en la etiqueta de la jeringa prellenada.
- El medicamento contenido en la jeringa prellenada es transparente e incoloro a levemente amarillento.
- **No** utilice la jeringa prellenada si alguno de sus componentes está agrietado o roto.
- **No** utilice la jeringa prellenada si el capuchón gris de la aguja no está o está suelto.
- **No** utilice la jeringa prellenada si el medicamento presenta algún cambio de color o contiene grumos, copos o partículas coloreadas de gran tamaño.
- **No** utilice la jeringa prellenada si ya ha pasado la fecha de caducidad que aparece en la jeringa prellenada.

<table>
<tr><th colspan="2">Paso 2: Prepárese</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Tire cuidadosamente del capuchón gris de la aguja en línea recta alejándolo del cuerpo para retirarlo. No deje la aguja sin el capuchón gris durante más de 5 minutos, ya que esto podría secar el medicamento.</td></tr>
<tr><td>1.
 
Es normal que en la punta de la aguja haya una gota de medicamento.</td><td colspan="2">2.

Deposite inmediatamente el capuchón en el contenedor para desechar objetos punzantes.</td></tr>
<tr><td colspan="3">No retuerza ni doble el capuchón gris de la aguja. Esto podría dañar la aguja.
No vuelva a poner el capuchón gris de la aguja en la jeringa prellenada.</td></tr>
</table>

B	**Extraiga la burbuja/espacio de aire.**

Quizá observe una burbuja/espacio de aire en la jeringa prellenada de Repatha.

Si observa una burbuja/espacio de aire:

- Sujete la jeringa prellenada con la aguja hacia arriba.
- Golpee suavemente el cuerpo de la jeringa con los dedos hasta que la burbuja/espacio de aire suba a la parte superior de la jeringa.
- Lentamente y con cuidado, empuje el émbolo para sacar el aire de la jeringa prellenada. Tenga cuidado de que no salga nada de medicamento.



- **No** golpee la aguja de la jeringa.

C	**PELLIZQUE el sitio de inyección para crear una superficie firme.**



Pellizque con firmeza la piel entre el pulgar y los dedos abarcando una zona de unos 5 centímetros de ancho.

Es importante mantener el pellizco durante la inyección.

Paso 3: Inyección

A	**Sostenga la piel PELLIZCADA. Inserte la aguja dentro de la piel con un ángulo de entre 45 y 90 grados.**



- **No** ponga el dedo en el émbolo mientras inserta la aguja.

B	**Lentamente y ejerciendo una presión constante, EMPUJE el émbolo del todo hasta que la jeringa se vacíe.**



C	**Al finalizar, RETIRE el pulgar y saque con cuidado la jeringa de la piel.**



- **No** vuelva a poner el capuchón gris de la aguja en la jeringa usada.

Paso 4: Finalización	
A	**Deposite inmediatamente la jeringa usada en un contenedor para desechar objetos punzantes.**

Pregunte al profesional sanitario que lo atiende cómo eliminar correctamente las jeringas. Es posible que exista una normativa local al respecto.

- **No** vuelva a utilizar la jeringa usada.
- **No** utilice el medicamento que pueda quedar en la jeringa usada.
- **No** recicle la jeringa ni el contenedor para desechar objetos punzantes, ni los tire a la basura.

Mantenga la jeringa usada y el contenedor para desechar objetos punzantes fuera de la vista y del alcance de los niños.

B	**Examine el lugar de la inyección.**

Si observa sangre, presione el lugar de la inyección con un algodón o una gasa. Aplique una venda adhesiva si es necesario.

- **No** frote el lugar de la inyección.

Instrucciones de uso: Repatha auto inyector prellenado de uso único

Guía de los componentes	
Antes del uso	**Después del uso**
Botón gris de inicio Fecha de caducidad Ventana Medicamento Capuchón naranja colocado Protector de seguridad amarillo (aguja en el interior)	Fecha de caducidad Ventana amarilla (inyección completa) Protector de seguridad amarillo (aguja en el interior) Capuchón naranja retirado
Importante: La aguja se encuentra en el interior del protector de seguridad amarillo.	

Importante
Antes de utilizar un autoinyector prellenado de uso único de Repatha, lea esta información importante: • **No** congele el autoinyector prellenado de Repatha ni utilice un autoinyector que se haya congelado. • **No** retire el capuchón naranja del autoinyector prellenado de Repatha antes de estar listo para la inyección. • **No** utilice el autoinyector prellenado de Repatha si ha caído sobre una superficie dura. Es posible que algún componente del autoinyector prellenado de Repatha esté roto, aunque no pueda ver la rotura.

Paso 1: Preparación	
A	**Saque un autoinyector prellenado de Repatha del envase.**
1.	Levante con cuidado y en línea recta el autoinyector prellenado para sacarlo de la caja.
2.	Vuelva a meter en el refrigerador el envase original con los autoinyectores prellenados sin usar.
3.	Espere por lo menos 30 minutos a que el autoinyector prellenado alcance naturalmente la temperatura ambiente antes de aplicar la inyección.
•	**No** intente calentar el autoinyector prellenado con una fuente de calor como agua caliente o un microondas.
•	**No** exponga el autoinyector prellenado a la luz directa del sol.
•	**No** agite el autoinyector prellenado.
•	**No** retire el capuchón naranja del autoinyector prellenado antes de tiempo.

B	**Inspeccione el autoinyector prellenado de Repatha.**

Protector de seguridad amarillo
(aguja en el interior)



Capuchón naranja colocado Ventana Medicamento

Asegúrese de que el medicamento de la ventana sea transparente y entre incoloro y amarillento.

Compruebe la fecha de caducidad.

- **No** utilice el autoinyector prellenado si el medicamento está turbio o presenta algún cambio de color, o contiene grumos, copos o partículas de gran tamaño.
- **No** utilice el autoinyector prellenado si algún componente está agrietado o roto.
- **No** utilice el autoinyector prellenado si se ha caído.
- **No** utilice el autoinyector prellenado si el capuchón naranja no está o está suelto.
- **No** utilice el autoinyector prellenado si ya ha pasado la fecha de caducidad.

En cualquiera de estos casos, utilice una autoinyector prellenado nuevo.

C	**Reúna todos los materiales que necesita para la inyección.**
Lávese bien las manos con agua y jabón. Sobre una superficie de trabajo limpia y bien iluminada, coloque lo siguiente:: • Una autoinyector prellenado nuevo. • Paños con alcohol. • Un algodón o una gasa. • Venda adhesiva • Un contenedor para desechar objetos punzantes.	
	

D	**Prepare y limpie la zona de inyección.**



Solo utilice los siguientes lugares para la de inyección:

- Muslo.
- Área del estómago (abdomen), excepto los 5 centímetros alrededor del ombligo.
- Parte externa del antebrazo (únicamente si es otra persona la que le administra la inyección).

Limpie el lugarde inyección con un paño con alcohol. Deje que la piel se seque.

- **No** vuelva a tocar esta área de la piel antes de la inyección.
- Seleccione un lugar diferente para cada inyección. Si necesita utilizarel mismo lugar para la inyección, asegúrese de no aplicar la inyección en el mismo punto que la última vez.
- **No** aplique las inyecciones en un área donde la piel presente dolor a la palpación o moretones, o esté enrojecida o dura. Evite los lugares con cicatrices o estrías.

<table>
<tr><th colspan="2">Paso 2: Prepárese</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Tire del capuchón naranja en línea recta para retirarlo, únicamente cuando esté listo para la inyección. No deje más de 5 minutos el autoinyector prellenado sin el capuchón naranja, ya que esto podría secar el medicamento.</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
Capuchón naranja
Es normal que en la punta de la aguja o del protector de seguridad amarillo haya una gota de medicamento.
No gire, doble o retuerza el capuchón naranja.
No vuelva a poner el capuchón naranja en el autoinyector prellenado.
No coloque los dedos en el protector de seguridad amarillo.
Importante: No retire el capuchón naranja de la autoinyector prellenado hasta que esté listo para la inyección.
Si no puede inyectarse, comuníquese con su proveedor de atención médica.</td></tr>
</table>

B	Cree una superficie firme en la zona de inyección seleccionada (muslo, estómago o parte externa del antebrazo) con el método de estiramiento o el método de pellizco.

Método del estiramiento



Estire firmemente la piel desplazando el pulgar y los dedos en direcciones opuestas para crear una zona de unos 5 centímetros de ancho.

O

Método de pellizco



Pellizque firmemente la piel entre el pulgar y los dedos abarcando una zona de unos 5 centímetros de ancho.

Importante: Es importante mantener la piel estirada o pellizcada durante la inyección.

Paso 3: Inyección	
A	Continúe sosteniendo la piel estirada o pellizcada. Una vez retirado el capuchón naranja, **coloque** el protector de seguridad amarillo sobre su piel con un ángulo de 90 grados. La **aguja se encuentra dentro** del protector de seguridad amarillo. **No** toque el botón de inicio gris aún.
Protector de seguridad amarillo (aguja en el interior)	

B	**Empuje** con firmeza el autoinyector prellenado sobre la piel hasta que deje de moverse.
	**Importante:** Debe empujar el autoinyector todo lo que pueda, pero **no** toque el botón de inicio gris hasta que esté listo para la inyección.

C	Cuando esté listo para la inyección, **pulse** el botón de inicio gris. Oirá un **clic**.
“clic”	

D	Siga **empujando** sobre la piel. A continuación, **retire** el pulgar mientras continúa sosteniendo la autoinyector prellenado sobre la piel. La inyección podría tardar unos 15 segundos en completarse.
“clic” 	**15 segundos**  La ventana cambia de transparente a amarilla cuando se ha completado la inyección. Podría oír un segundo clic.
	**NOTA:** Una vez que retire el autoinyector prellenado de la piel, la aguja se cubrirá automáticamente.

Paso 4: Finalización	
A	**Deseche el autoinyector prellenado usado y el capuchón naranja de la aguja.**

Deposite el autoinyector prellenado usado y el capuchón naranja en un contenedor para desechar objetos punzantes.

Pregunte al profesional de la salud que lo atiende cómo eliminar correctamente los autoinyectores. Es posible que exista una normativa local al respecto.

Mantenga el autoinyector prellenado y el contenedor para desechar objetos punzantes fuera de la vista y del alcance de los niños.

- **No** vuelva a utilizar el auto inyector prellenado.
- **No** vuelva a ponerle el capuchón al autoinyector prellenado o meter los dedos en el protector de seguridad amarillo.
- **No** recicle el autoinyector prellenado o el contenedor para desechar objetos punzantes, ni los tire a la basura.

B	**Examine el lugar de la inyección.**
Si observa sangre, presione el lugar de la inyección con un algodón o una gasa. **No** frote el lugar de la inyección. Aplique una venda adhesiva si es necesario.	