

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

MAGNATIL-C CÁLCICO COMPRIMIDOS EFERVESCENTES

MAGNATIL-C CÁLCICO COMPRIMIDOS EFERVESCENTES

Vitamina C con Magnesio y Calcio

30 comprimidos efervescentes

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido efervescente contiene:

Ácido Ascórbico	100,00 mg
Magnesio (como óxido y sulfato)	103,20 mg
Calcio	250,00mg

Excipientes c.s.: Ácido cítrico, Bicarbonato de Sodio, Ácido adípico, Sacarina de sodio, Aspartamo (20mg), Saborizante limón, Saborizante naranja, Colorante FD&C amarillo N°6 (Amarillo crepúsculo), Sorbitol 70%.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

ACCIÓN TERAPÉUTICA E INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de la hipomagnesemia asociada con hipovitaminosis C.

Aporte de Calcio.

Suplemento en estados carenciales de Magnesio y Vitamina C, con aporte de Calcio.

CONTRAINDICACIONES:

- Insuficiencia renal grave

Página 1 de 3

Esta información es propiedad de Tecnofarma S.A. Su contenido está dirigido a profesionales prescriptores, se prohíbe la reproducción, divulgación o utilización total o parcial de este documento o de su contenido, salvo autorización expresa del propietario y con consentimiento por escrito. Este documento ha sido preparado según lo aprobado por el ISP bajo Resolución Exenta RW N°18729/11 para el producto REG. ISP N° 19011/21.

CL--2400055

- Insuficiencia hepática grave
- Hipercalcemia
- Antecedentes de cálculos renales a repetición
- Úlcera gástrica
- Insuficiencia gástrica
- Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Ocasionalmente trastornos gástricos leves y diarreas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

No tomar más de tres comprimidos al día, ni tomar la dosis máxima por un período de más de 2 semanas, salvo por indicación médica expresa.

- Puede tener efecto laxante
- Debe controlarse la magnesemia, a fin de suspender el tratamiento oportunamente.
- Si está embarazada o amamantando, debe consultar al médico antes de tomar este medicamento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Evitar la administración conjunta con tetraciclinas, porque disminuye la absorción del antibiótico.

La administración conjunta con sales cálcicas o productos a base de fosfatos inhiben la absorción intestinal del magnesio.

Precauciones:

No administrar más de tres comprimidos al día, ni administrar la dosis máxima por un período de más de 2 semanas.

Puede tener efecto laxante.

Debe controlarse la magnesemia, a fin de suspender el tratamiento oportunamente.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Disolver el comprimido efervescente en medio vaso de agua o bebida refrescante.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 30 comprimidos en blíster de aluminio, dentro de cajas de cartón litografiadas.

CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco y seco a no más de 30°C.